

Подготовка пациента к ЭЭГ.

- Провести психотерапевтическую подготовку больного - разъяснить безвредность исследования, объяснить общий его ход.
- Если позволяет функциональное состояние больного - отменить все препараты, которые изменяют функциональное состояние мозга (транквилизаторы, нейролептики и пр.). Если нет – указать препараты, которые больной принимает.
- При приёме противоэпилептических препаратов (ПЭП): при стабильном состоянии, если нет необходимости изменения схемы приёма или отмены ПЭП, для определения стабильности состояния, - ЭЭГ проводят без отмены ПЭП.

При изменении схемы приёма или отмене ПЭП - ЭЭГ проводят на фоне пропуска утреннего приёма. Пациент принимает ПЭП после выполнения ЭЭГ.

- ЭЭГ проводят через 2 часа после еды.
- ЭЭГ проводят через 2 часа после курения.
- ЭЭГ проводят с опорожнённым мочевым пузырём – может провоцировать эпилепсию.
- ЭЭГ проводят через 3 дня после алкогольного эксцесса.
- ЭЭГ проводят через неделю после эпилептического приступа, или накануне предполагаемого приступа, чтобы избежать ситуации состояния разряда.
- ЭЭГ проводят с чистой головой. Недопустимо применение средств для укладки волос.
- Недопустимо наличие гаджетов
- Предоставляется история болезни, результаты прежних ЭЭГ — исследований, другая мед. документация.